

Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова

Санкт-Петербург, Российская Федерация

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕБЮТА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Фармакорезистентная эпилепсия - форма заболевания, при которой приступы продолжаются, несмотря на адекватную противоэпилептическую терапию двумя ПЭП в виде монотерапии или в комбинации.

Введение

Неконтролируемая судорожная активность и травматизация влечет за собой высокий уровень инвалидизации, особенно в периоде раннего детства. Данное исследование направлено на выявление гендерно-возрастных групп, в которых риск дебюта заболевания наиболее высок.

Цель

исследовать гендерно-возрастные особенности дебюта эпилепсии.

Методы и материалы

- > открытые ретроспективные когортные исследования
- ➤ на базе РНХИ им. проф. А.Л. Поленова
- > 100 пациентов нейрохирургического профиля с фармакорезистентной эпилепсией
- ➤Критерии включения: лица старше 18 лет, страдающие фокальной фармакорезистентной структурной эпилепсией.
- > Критерии исключения: лица,с эпилепсией, имеющие иную этиологию.
- ➤Данные получены из медицинской документации

Результаты

Среди 100 пациентов, пролеченных во 2 нейрохирургическом отделении, при анализе гендерного состава значимой разницы не выявлено (мужчины -53%, женщины -47%).

Выводы


Значимые различия в гендерном составе наблюдаются в периодах раннего детства, первого и второго детства, подростковом периоде. В юношеском периоде значимых различий по гендерному признаку нет.

Для мужчин более характерен дебют фармакорезистентной эпилепсии в раннем и первом детстве Для женщин более свойственно начало в периоде второго детства и подростковом периоде. Наиболее часто дебют заболевания у мужчин приходился на 15 лет, у женщин - на 14 лет, что, вероятно, связано


со становлением менструального цикла у девочек и проконвульсивным действием эстрогена.

Финансирование

Государственное задание № 1122011900530-8



Средний возраст дебюта эпилепсии в 1гр. - 11 ± 7,8 лет. Минимальный возраст дебюта до 1 года, максимальный - 29 лет. Наиболее часто дебют в 15 лет



Средний возраст дебюта эпилепсии во 2гр. составил 13,5 ± 7,3 лет. Минимальный возраст дебюта до 1 года, максимальный -36 лет. Наиболее часто дебют в 14 лет.



Контакты: Katrina_2211@mail.ru